

Usage des psychotropes

dans les maisons de repos (MR) belges

L'usage des psychotropes chez les personnes âgées reste **élevé**, alors que seulement **8 à 9 %*** d'entre elles souffrent réellement **des troubles pour lesquels ces médicaments sont indiqués**.

* Données Sciensano 2025

Les **antipsychotiques** et **antidépresseurs** sont davantage utilisés par **les personnes en perte d'autonomie**.

L'usage de ces médicaments est **plus élevé** chez les résidents **plus jeunes** (65-74 ans) que chez les plus âgés (75 ans et plus).



ANTIPSYCHOTIQUES

Les **antipsychotiques** sont davantage utilisés par les **bénéficiaires de l'intervention majorée (28,2 %)** que par les non bénéficiaires (**20,2 %**).


ANTIDÉPRESSEURS

L'usage chronique d'**antidépresseurs** est plus élevé chez les **femmes (50,8 %)** que chez les **hommes (46,1 %)**.



Dans les 25 % des maisons de repos avec la plus forte consommation, **25 %** des résidents reçoivent **des antipsychotiques** de façon chronique.

Près de deux fois plus que dans les 25 % de centres ayant le plus faible taux d'utilisation (**13 %**).




58 % des résidents dans le quart des centres où l'utilisation est la plus élevée reçoivent des **antidépresseurs** de manière chronique.


Contre **47 %** des résidents dans le quart des centres où la consommation est plus modérée.

Évolution de l'usage des médicaments avant et après l'entrée en maison de repos

ANTIPSYCHOTIQUES




ANTIDÉPRESSEURS



Utilisation chronique d'antidépresseurs ou d'antipsychotiques selon le profil des résidents

ANTIPSYCHOTIQUES



ANTIDÉPRESSEURS

