

Psychofarmacagebruik


in Belgische woonzorgcentra (WZC)

Het gebruik van psychofarmaca bij ouderen blijft **hoog**,
terwijl slechts **8-9%*** met de **betreffende aandoeningen** kampt.

*data van Sciensano (2025)

Antipsychotica en **antidepressiva** worden **meer**
gebruikt door **mensen die zorgbehoevender zijn**
dan door mensen die minder zorgbehoevend zijn.

Het gebruik van **antidepressiva** en van **antipsychotica**
ligt **hoger bij jongere bewoners** (65-74 jarigen) dan
bij oudere bewoners (75+).



ANTIPSYCHOTICA

Antipsychotica worden **meer** gebruikt
door mensen **met een verhoogde
tegemoetkoming (28,2%)** dan door
mensen zonder **(20,2%)**.

ANTIDEPRESSIVA

Het chronisch gebruik van
antidepressiva ligt
hoger bij vrouwen (50,8%)
dan **bij mannen (46,1%)**.



2x

In de 25% centra met het
hoogste gebruik krijgt **25%**
van de bewoners **chronisch
antipsychotica toegediend**.

Bijna dubbel zoveel als in de
25% centra met het laagste
gebruik **(13%)**.

58%


↓
47%

58% van de bewoners in de
25% centra met het hoogste
gebruik, krijgt **chronisch
antidepressiva toegediend**.


Tegenover **47%** in de 25%
centra met het laagste gebruik.

Evolutie geneesmiddelengebruik voor en na verhuis naar een WZC

ANTIPSYCHOTICA




ANTIDEPRESSIVA



Het chronisch gebruik van antidepressiva of antipsychotica volgens het profiel van de bewoners

ANTIPSYCHOTICA



ANTIDEPRESSIVA

